

لیا طیف

دشیار

« شرکت کشاورزی »

تولید و تأمین عمده بذر و نهال اصلاح شده

Email : iran\_dashtyar@yahoo.com



بذر و نهال

تأسیس ۱۳۷۸

مرزنخوش یا مرزنگوش



*Origanum sp.*

از خانواده (نعناع)



نشریه تحقیقی ترویجی شماره ۱۹

اصفهان، خیابان هشت بهشت شرقی، جنب مجتمع تجاری بهشت پلاک ۸۸۲

تلفن: ۰۳۱۱۷۶۴۱۶۳ - ۰۳۱۱۷۶۴۵۵۱

فاکس: ۰۳۱۱۳۷۶۴۸

مرزنجوش از گیاهان دارویی است که خود را با شرایط متفاوت محیط زندگی در نواحی مختلف انطباق داده است. این گیاه از تیره نعناآ و یکساله تا پایا است. در نواحی گرم به صورت پایا، در منطقه مدیترانه به صورت گیاهی دو ساله و در نواحی معتدل به صورت گیاه یکساله رشد می‌کند. مانند بسیاری از گیاهان تیره نعناء تمام اندام‌های هوایی گیاه دارای تارهای غده‌ای است که اسانس مطبوعی از آنها متصاعد می‌گردد. برگها متقابل، دمبرگ دار، تخم مرغی یا بیضی شکل با گلهای کوچک به رنگ‌های سفید تا صورتی و سرخ که به صورت مجتمع و خوش‌های که بسته به شرایط زیست و نوع گونه از خرداد تا اوخر مرداد و حتی مهرماه ظاهر می‌شود. وزن هزار دانه از ۰/۰۹۵۲ تا ۰/۱۸۷ گرم و تعداد بذر در یک گرم از ۵۳۰۰ تا ۱۰۵۰۰ عدد می‌باشد که این میزان بستگی به نوع گونه دارد. استاندارد قوه نامیه حدود ۷۰٪ و دوام آن نیز طولانی می‌باشد.

در ایران سه گونه مرزنجوش به صورت وحشی انتشار دارند:

-۱ *origanum vulgare*

-۲ *origanum strobilaceum*

-۳ *origanum viride*

که جملگی در شمال کشور از حوالی حیران اردبیل، آستانه اسلام‌آباد و شهرستانهای مختلف گیلان و مازندران و به طرف شمال شرق استان گلستان مراوه‌تپه و تا حوالی بجنورد دیده می‌شود. در بازارهای تجارت و صادراتی دنیا از دو نوع مرزنجوش، یکی اهلی (یا اصلی) *O. Magorana* و دیگری وحشی *O. vulgare* نامبرده می‌شود. در این مقاله به معرفی گیاه مرزنجوش مازورانا می‌پردازیم که کاربرد وسیع تری دارد.

مرزنجوش مازورانا گیاهی است به ارتفاع ۲۰ تا ۵۰ سانتی‌متر ساقه مایل به قهوه‌ای راست کرکدار با برگ‌های متقابل، بیضی شکل انبوه، فاقد دندانه در دو سطح به رنگ نمایی خاکستری و دارای طعم و بوی بسیار قوی با گلهای کوچک سفید تا صورتی کم رنگ خوش‌های که گلهای اغلب در تیر و مرداد و حتی مهرماه ظاهر می‌شوند.

### قسمت‌های استفاده:

برگ و سر شاخه‌های گلدار

### تركیبات شیمیایی:

دارای ترکیبات تاننی، ماده‌ای تلخ با اسانس فرار و مواد دیگری از جمله ماده‌ای با خواص گندزدایی است. اسانسی که با تقطیر با بخار آب به دست می‌آید زرد رنگ مایل به سبز و بویی مخصوص و طعمی ملایم دارد. ترکیب این اسانس بر حسب کشت در محیط‌های مختلف، متفاوت است و معمولاً "دارای ۴۰٪ از ترپن‌ها به ویژه ترپین نن (Terpinene)، ترپینئول، سابی نن (Sabinene) و مقدار زیادی مواد طبیعی است.

### محیط‌شناسی و بررسی رویشگاه:

به نظر می‌رسد سرزمین اصلی این گیاهان حوزه دریایی مدیترانه منطقه معتدل‌هه شمالی، آمریکا و احتمالاً "آفریقای شمالی (مصر و مراکش)" بوده و همچنین خاور نزدیک باشد. بعضی محققین منشا اصلی آن را ایران ذکر کرده‌اند. انواع خودروی آن در اکثر نواحی معتدل، در چمن‌زارها و زمین‌های بایر رشد می‌کند.

### روش تکثیر و زراعت:

روش‌های تکثیر این گیاه به وسیله بذر، قلمه زدن و یا کاشتن قطعات جوانه دار است.

تکثیر از طریق قلمه در اوخر شهریور ماه صورت می گیرد ولی کشت از طریق بذر می بایستی ابتدا در زمین خزانه انجام گرفته و پس از رشد اولیه، نشا حاصل به زمین اصلی منتقل گردد.

مرزنگوش نیاز به زمینی حاصلخیز، پوک و آفتابگیر دارد. اراضی شور، قلیایی ضعیف مناسب کشت نمی باشند. زمین های خزانه و کاشت نشاقبل از شخم را می بایستی سر فرصت با کود حیوانی کاملانه "پوسیده و کود شیمیایی مخلوط، شخم زده و آماده کرد. زمان بذر کاری در خزانه از اوایل اسفند تا اواسط فروردین ماه است (مقدار بذر خالص ۱۲ کیلو در هکتار). رویش نهایی نشا تولید شده جهت انتقال به زمین اصلی، اوایل خرداد ماه می باشد.

### نیاز کودی:

زمین اصلی که حداقل ۴۰ تن در هکتار کود دامی کاملانه "پوسیده با آن مخلوط و آماده شده نیاز به ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو کود ازته، ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلو سوپر فسفات، ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو نمک پتاسیم ۴۰٪ دارد.

### زمان گلدهی و برداشت محصول:

گلها از تیر تا اوخر مرداد ماه ظاهر گردیده و برداشت محصول قاعده‌تا" در نیمه دوم مرداد ماه صورت می گیرد. هر هکتار  $\frac{1}{6}$  تا  $\frac{2}{8}$  تن محصول خشک تجاری و به صورت محصول برگ،  $\frac{2}{8}$  تا  $\frac{4}{8}$  تن در هکتار بازدهی این گیاه است. محصول جمع شده را در دستگاه خشک کن در حرارت ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد خشک کرده و در عدلهای کنفرانسی ۵۰ کیلوگرمی بسته بندی و وارد بازار تجارت می کنند.

### آفات، بیماری و علف هرز:

مهمترین موضوع در کشت مرزنگوش، مبارزه با علف هرز و نگهداری از زمین است. از اواسط اردیبهشت باید زمین را چندین بار دیسک یا کولتیواتر زد. قبل از کشت سempاشه با تنوران، آلیپور، دورینول و پس از کشت با ونزار، پاتوران و آرزین اعمال می گردد. تا آنجایی که امکان دارد بایستی از به کار بردن مواد شیمیایی و علف کش ها در کشت گیاهان دارویی اجتناب کرد.

### خواص:

اندام های هوایی گیاه دارای خواص درمانی متعدد از جمله باد شکن، معرق، نیرو دهنده، قاعده آور، آرام کننده، محرک اشتها، مقوی معده و قلب، التیام دهنده زخم ها، ضد تشنج و دردهای روماتیسمی، رفع میگرن و ناراحتی های تنفسی، بی خوابی و اعصاب است. نحوه مصرف به دو صورت دم کرده و استعمال خارجی است: دم کرده: ۵-۱۰ گرم پودر برگ خشک و یا ۲۵-۵۰ در هزار برگ تازه را در یک لیتر آب جوشیده به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه دم کرده، صاف کرده و روزی ۲-۳ فنجان قبل از غذا مصرف می شود.

استعمال خارجی: به صورت اضافه کرده برگ خشک پودر شده در روغن زیتون و مالیدن به محل درد به صورت پماد و نیز غوطه ور شدن در وان حمام.

ضمنا" برگ و گل برای معطر سازی غذاها از جمله در تهیه سوسيس، پيتزا و در صنعت عطر سازی و تهیه صابون های معطر استفاده فراوان دارد. در صنعت در فرمول الکلا Alcoolats و الکلاتور Alcoolature و لتر استفاده بسیار دارد.

### منابع:

- ۱- جاوید تاش، ایرج؛ کشت تا برداشت گیاه مرزنگوش، مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراعع ۱۳۷۳
- ۲- دکتر صمصم شریعت، هادی؛ پرورش و تکثیر گیاهان دارویی، انتشارات مانی ۱۳۷۴
- ۳- دکتر احمد قهرمان، فلور ایران، جلد دوم- چهارم و ششم
- ۴- آرشیو اطلاعات تجربی و کاربردی بخش تولید و فرآوری گیاهان دارویی و صنعتی شرکت دشتیار